

Ferto-LAC 3 – for sunde og stærke føl



Stutteri Zangersheides
foretrukne foder til avlsheste,
gennem mere end to årtier!

Sammensætning: Varmebehandlet byg, varmebehandlet majs, varmebehandlet hvede, havre, hvedeklid, roepulp, hørfrø, planteolier, lucerne, melassesirup, foderkridt, Multi-Calcium-Complex, vitaminer, essentielle aminosyrer, beta-karoten, salt, gærkultur, elektrolytter, mineraler, sporstoffer og antioxidant.

Udseende og emballage: Koldpressede 7 mm piller i 25 kg sæk

Energiindhold: Højt

Velegnet til:

- Drægtige hopper fra 8.-9. drægtigheds måned samt diegivende hopper
- Hopper med frugtbarhedsproblemer, pga. højt indhold af beta-karoten
- Aktive avlshingste


Udviklingen af sunde og stærke føl starter allerede i fosterstadiet! Ferto-LAC 3 sikrer drægtige og diegivende hopper den bedst tænkelige forsyning af næringsstoffer og giver hoppen det nødvendige overskud til at opretholde både sit eget huld, en sund udvikling af fosteret og siden en tilstrækkelig mælkeproduktion til føllet. Som et af de eneste foderprodukter til avlshopper, indeholder Ferto-LAC 3 hele 3 forskellige og let optagelige calciumkilder (Multi-Calcium-Komplex), der sikrer en stabil og kontinuerlig frigivelse af calcium. En optimal tilførsel af calcium virker sammen med det høje indhold af kobber afbalancerende på knoglevæksten hos foster/føl, hvilket er af afgørende betydning ved OCD-forebyggelse. Ferto-LAC 3 har desuden et meget højt indhold af naturligt beta-karoten (pro-vitamin A), der virker fremmende på frugtbarheden, hvorved ifolingschancen øges, ligesom chancen for at opretholde en allerede opnået drægtighed forbedres. Tidspunktet omkring foling er det mest kritiske for avlshoppen, idet der skal produceres tilstrækkelige mængder mælk til det nyfødte føl, samtidig med at hoppen ofte skal ifoles igen - helst uden problemer, ekstra udgifter og ærgelser. Ferto-LAC 3 tilgodeser både kravet til en optimal forsyning til føllet og kravet til optimal frugtbarhed hos hoppen. Produktets høje indhold af næringsstoffer gør det tillige særdeles velegnet til avlshingste.

Fodervejledning: Se næste side af dette datablad. Husk at hesten hver dag skal have mindst 1,2 kg godt hø el. 1,4 kg wrap pr. 100 kg, samt adgang til frisk drikkevand og saltsten.

Næringsindhold:

<i>Energi</i>	0,97 FE/kg	<i>Vit. E.</i>	250 mg/kg	<i>Magnesium (Mg)</i>	3,0 g/kg
<i>Ford. råprotein</i>	11,8%	<i>Biotin</i>	120 mcg/kg	<i>Natrium (Na)</i>	5,0 g/kg
<i>Stivelse</i>	27,5%	<i>Vit. K3</i>	0,9 mg/kg	<i>Kalium (K)</i>	12,0 g/kg
<i>Sukker</i>	6,0%	<i>Vit. B1</i>	3,0 mg/kg	<u>Sporstoffer :</u>	
<i>Råfibre</i>	9,5%	<i>Vit. B2</i>	4,8 mg/kg	<i>Jern (Fe)</i>	270,0 mg/kg
<i>Råfedt</i>	3,6%	<i>Vit. B6</i>	3,0 mg/kg	<i>Kobber (Cu)</i>	60,0 mg/kg
<i>Råaske</i>	7,5%	<i>Vit. B12</i>	20,0 mcg/kg	<i>Zink (Zn)</i>	200,0 mg/kg
<u>Essentielle aminosyrer:</u>		<i>Panthothensyre</i>	23,0 mg/kg	<i>Mangan (Mn)</i>	110,0 mg/kg
<i>Lysin</i>	5,4 g/kg	<i>Niacin</i>	21,0 mg/kg	<i>Cobalt (Co)</i>	1,2 mg/kg
<i>Methionin</i>	+ 5,2 g/kg	<i>Folinsyre</i>	5,2 mg/kg	<i>Iod (I)</i>	0,8 mg/kg
<i>Cystein</i>				<i>Selen (Se)</i>	800,0 mcg/kg
<i>Threonin</i>	5,0 g/kg	<i>Cholinchlorid</i>	190,0 mg/kg		
<i>Tryptofan</i>	1,8 g/kg	<u>Mineraler:</u>			
<u>Vitaminer (tilsat):</u>		<i>Calcium (Ca)</i>	12,0 g/kg		
<i>Vit. A</i>	15,000 IE/kg	<i>Phosphor (P)</i>	6,0 g/kg		
<i>Vit. D-3</i>	2,200 IE/kg	<i>Ca/P</i>	2,0		

Fodervejledning HAVENS FertoLAC3



Hestens vægt	Før foling	0.-3. mdr.	4.-6. mdr.
200 kg	0,5-1,2 kg Ferto-LAC 3 Evt. 0,25-0,5 kg Lucerne mindst 3 kg hø	1,2-1,8 kg Ferto-LAC 3 Evt. 0,25-0,75 kg Lucerne mindst 3 kg hø	1,8-1,0 kg Ferto-LAC 3 Evt. 0,25-0,75 kg Lucerne mindst 3 kg hø
300 kg	1,0-1,6 kg Ferto-LAC 3 Evt. 0,25-0,75 kg lucerne mindst 4 kg hø	1,6-2,2 kg Ferto-LAC 3 Evt. 0,5-1,0 kg lucerne mindst 4 kg hø	2,2-1,4 kg Ferto-LAC 3 Evt. 0,5-1,0 kg lucerne mindst 4 kg hø
400 kg	1,5-2,1 kg Ferto-LAC 3 Evt. 0,5-1,0 kg lucerne mindst 5 kg hø	2,1-3,1 kg Ferto-LAC 3 Evt. 0,75-1,25 kg lucerne mindst 5 kg hø	3,1-1,7 kg Ferto-LAC 3 Evt. 0,75-1,25 kg lucerne mindst 5 kg hø
500 kg	2,0-2,7 kg Ferto-LAC 3 Evt. 0,5-1,0 kg lucerne mindst 6 kg hø	2,7-3,8 kg Ferto-LAC 3 Evt. 0,75-1,25 kg lucerne mindst 6 kg hø	3,8-2,5 kg Ferto-LAC 3 Evt. 0,75-1,25 kg lucerne mindst 6 kg hø
600 kg	2,5-3,2 kg Ferto-LAC 3 Evt. 0,75-1,25 kg lucerne mindst 7-8 kg hø	3,2-4,5 kg Ferto-LAC 3 Evt. 1,0-1,5 kg lucerne mindst 7-8 kg hø	4,5-3,0 kg Ferto-LAC 3 Evt. 1,0-1,5 kg lucerne mindst 7-8 kg hø
700 kg	3,0-3,7 kg Ferto-LAC 3 Evt. 1,0-1,5 kg lucerne mindst 8-9 kg hø	3,7-5,0 kg Ferto-LAC 3 Evt. 1,0-1,5 kg lucerne mindst 8-9 kg hø	5,0-3,5 kg Ferto-LAC 3 Evt. 1,0-1,5 kg lucerne mindst 8-9 kg hø

Bemærk: Avlshoppens huld kan variere meget og er bl.a. afhængig af forhold som race, årstid, græsmængde og mælkeproduktion. Hold derfor ekstra øje med hoppen og tilpas fodermængden i tide så overvægt eller dårligt huld undgås. Ved adgang til god græsning i forår og de tidlige sommer måneder kan hø og lucerne udelades og mængden af Ferto-LAC reduceres og i stedet suppleres med HAVENS Urtemineral. Kontakt vores foderrådgivning for råd og vejledning.

Avlshopper kan med fordel tildeles EquiForce Sacc fra 1 måned før foling, idet produktets indhold af Bio-MOS® i dokumenterede forsøg har vist sig at øge mælkenes indhold af antistoffer og dermed føllets modstandskraft. Læs mere om dette produkt på www.havens.dk